RO

Instrucțiuni de utilizare
Lentile de contact ACUVUE® zilnice, de unică folosință

CE 2797

IFU000565

A SE CITI CU ATENȚIE ȘI A SE PĂSTRA PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ. LENTILELE DE CONTACT ACUVUE® SUNT DISPOZITIVE MEDICALE ȘI TREBUIE SĂ FIE APLICATE ÎNTOTDEAUNA DE UN PROFESIONIST ÎN DOMENIUL OFTALMOLOGIC. URMAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTRUCȚIUNILE PROFESIONISTULUI ÎN DOMENIUL OFTALMOLOGIC ȘI INSTRUCȚIUNILE DIN ACEST GHID.

Denumirea mărcii	Material	Soluție de ambalare	Regim de purtare
Lentile de contact 1-DAY ACUVUE®	etafilcon A	1	1 zi
Lentile de contact 1-DAY ACUVUE® MOIST	etafilcon A	3	1 zi
Lentile de contact ACUVUE® OASYS cu tehnologia HydraLuxe™ 4	senofilcon A	2	1 zi
Lentile de contact 1-DAY ACUVUE® TruEye® 4	narafilcon A	2	1 zi
Lentile de contact 1-DAY ACUVUE® DEFINE® cu tehnologia LACREON®	etafilcon A	3	1 zi
Lentile de contact 1-DAY ACUVUE® MOIST pentru ASTIGMATISM	etafilcon A	3	1 zi
Lentile de contact ACUVUE® OASYS pentru ASTIGMATISM cu tehnologia HydraLuxe™ 4	senofilcon A	2	1 zi
Lentile de contact 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL	etafilcon A	3	1 zi

Legendă: **Soluție de ambalare:** 1 Soluție tamponată de borat 2 Soluție tamponată de borat cu metil eter celuloză 3 Soluție tamponată de borat cu povidonă. **Compoziția materialului:** 4 Materialul lentilelor conține silicon și îndeplinește standardele de protecție UV Clasa 1 cu transmisibilitate a mai puțin de 1% pentru radiațiile UVB (280-315 nm) și a mai puțin de 10% pentru cele UVA (315-380 nm). Toate celelalte produse ACUVUE® îndeplinesc standardele de protecție UV Clasa 2 cu transmisibilitate a mai puțin de 5% pentru radiațiile UVB și 50% pentru cele UVA.

Boracii (acidul boric și boratul de sodiu) sunt definiți ca substanțe din categoria CMR 1B, într-o concentrație de peste 0,1% fracție masică (gr./gr.) și prezintă siguranță atunci când produsul este utilizat conform instrucțiunilor de pe etichetă.

S-ar putea ca nu toate produsele enumerate să fie disponibile în țara dumneavoastră.
Verificați care produs este disponibil în țara dumneavoastră: www.acuvue.com

1. DESCRIEREA PRODUSULUI și INDICAȚIA DE UTILIZARE

Acest ghid se referă la lentilele de contact ACUVUE® zilnice, de unică folosință, care sunt destinate purtării pentru mai puțin de 24 de ore cât timp utilizatorul este treaz. Lentilele trebuie să vă fie prescrise de profesionistul în domeniul oftalmologic, care trebuie să stabilească regimul de purtare al acestora. Lentilele nu necesită curățare sau dezinfectare și trebuie aruncate imediat după îndepărtare.

- Lentilele de contact ACUVUE® sferice, zilnice, de unică folosință, sunt destinate purtării zilnice pentru corecția optică a miopiei (vedere de aproape) și a hipermetropiei (vedere la distanță) la persoanele fără boli ale ochilor, care au un astigmatism de 1,00 D sau mai puțin.
- Lentilele de contact 1-DAY ACUVUE® DEFINE® cu tehnologia LACREON® sunt destinate, de asemenea, să modifice/îmbunătățească aspectul ochilor.
- Lentilele de contact ACUVUE®, zilnice, de unică folosință, pentru ASTIGMATISM sunt destinate purtării zilnice pentru corecția optică a miopiei (vedere de aproape) și a hipermetropiei (vedere la distanță) la persoanele fără boli ale ochilor, care pot avea astigmatism.
- Lentilele de contact ACUVUE®, zilnice, de unică folosință, pentru PRESBIOPIE sunt destinate purtării zilnice pentru corecția optică a miopiei (vedere de aproape) și a hipermetropiei (vedere la distanță) la persoanele cu presbiopie, fără boli ale ochilor, care au un astigmatism de 0,75 D sau mai puțin.

NU PURTAȚI LENTILELE ÎN TIMPUL SOMNULUI.
Toate lentilele de contact ACUVUE® zilnice, de unică folosință, au un filtru UV care contribuie la protecția împotriva transmiterii radiațiilor UV nocive la nivelul corneei și al globului ocular.
AVERTISMENT: LENTILELE DE CONTACT CU PROTECȚIE UV nu constituie un substituent pentru ochelarii de soare sau dispozitivele oculare cu protecție UV, deoarece nu acoperă complet suprafața ochiului și anexele oculare. Trebuie să utilizați în continuare ochelari cu protecție UV conform recomandărilor. NOTĂ: expunerea îndelungată la radiații ultraviolete (UV) reprezintă unul dintre factorii de risc asociați cu apariția cataractei. Riscul se bazează pe o serie de factori, precum condițiile mediului înconjurător (altitudine, poziție geografică, cer senin/înnorat) și factori cu caracter personal (timpul de expunere și natura activităților desfășurate în mediul exterior). Lentilele de contact cu filtru UV contribuie la protecția împotriva radiațiilor ultraviolete cu efect nociv. Cu toate acestea, nu s-au efectuat studii clinice care să confirme că purtarea lentilelor de contact cu filtru UV reduce riscul apariției cataractei sau a altor afecțiuni oculare. Pentru mai multe informații, adresați-vă profesionistului în domeniul oftalmologic.

2. CONTRAINDICAȚII (a nu se utiliza)

Atunci când purtați lentile de contact pentru UTILIZARE ÎN CAZ DE AMETROPIE REFRACTIVĂ, **NU FOLOSIȚI** aceste lentile dacă există oricare dintre următoarele afecțiuni:
- inflamație sau infecție la nivelul sau în jurul ochiului sau al pleoapelor;
- orice afecțiune oculară, leziune sau anomalie care afectează corneea, conjunctiva sau pleoapele;
- orice afecțiune diagnosticată anterior care face ca purtarea lentilelor de contact să fie inconfortabilă;
- uscăciune oculară severă;
- sensibilitate redusă a corneei (hipoestezie corneeană);
- orice afecțiune sistemică ce poate avea efecte nocive la nivelul ochiului sau care poate fi agravată de purtarea lentilelor de contact;
- reacții alergice ale suprafeței ochiului sau ale țesuturilor adiacente care pot fi induse sau agravate de purtarea lentilelor de contact sau de utilizarea soluțiilor pentru lentile de contact;
- orice infecție activă la nivelul ochiului (bacteriană, fungică, cu protozoare sau virală);
- iritație sau înroșire a ochilor;
- iritație oculară cauzată de reacții alergice la ingredientele din soluțiile pentru lentile de contact (și anume, picături de reumectare). Aceste soluții pot conține substanțe chimice sau conservanți (precum mercur, thimerosal etc.) la care unele persoane pot dezvolta o reacție alergică.

3. AVERTISMENTE – ce trebuie să știți despre purtarea lentilelor de contact:

AFECȚIUNILE OCULARE, INCLUSIV ULCERELE CORNEENE (keratită ulcerativă), POT AVEA O EVOLUȚIE RAPIDĂ ȘI POT CAUZA PIERDEREA VEDERII. DACĂ PREZENTAȚI ORICARE DINTRE URMĂTOARELE SIMPTOME:
- disconfort ocular
- pierderea vederii
- modificări de vedere
- lăcrimare excesivă
- roșeață oculară

TREBUIE SĂ SCOATEȚI IMEDIAT LENTILELE DE CONTACT ȘI SĂ CONTACTAȚI DE URGENȚĂ PROFESIONISTUL ÎN DOMENIUL OFTALMOLOGIC.
- Aceste lentile de contact sunt prescrise pentru purtare zilnică și pentru o singură utilizare. Studiile au demonstrat că purtarea lentilelor de contact moi, de unică folosință, zilnice reduce riscul apariției anumitor complicații, inclusiv disconfort și inflamație, care sunt asociate cu întreținerea și manevrarea lentilelor, iar reutilizarea acestora vă poate expune unui risc crescut de apariție a acestor probleme.
- Lentilele de contact prescrise pentru purtarea zilnică, de unică folosință, nu trebuie purtate în timpul somnului. Studiile clinice au demonstrat că riscul apariției unor probleme oculare severe (precum keratită ulcerativă) crește atunci când lentilele sunt purtate în timpul nopții.[1]
- Studiile au arătat că persoanele fumătoare care poartă lentile de contact prezintă o rată de apariție a problemelor oculare (keratită ulcerativă) mai mare decât persoanele nefumătoare.
- Problemele induse de purtarea lentilelor de contact sau de produsele de întreținere a acestora ar putea provoca vătămări oculare severe.
- Utilizarea și întreținerea în mod corect ale lentilelor de contact și ale produselor de îngrijire a acestora sunt esențiale pentru utilizarea în siguranță a acestor produse.
- Riscul general de a dezvolta probleme oculare severe (precum keratită ulcerativă) poate fi redus urmând cu atenție instrucțiunile pentru purtarea și înlăturarea lentilelor.
- **Nu** expuneți lentilele de contact la **apă** pe perioada purtării. Apa poate conține microorganisme care pot provoca o infecție severă, pierderea vederii sau orbire. Dacă lentilele de contact au fost introduse în apă în timp ce participați la sporturi acvatice sau în timp ce vă aflați în cada de baie sau înotați într-o piscină, într-un lac sau într-un ocean, trebuie să le eliminați și să le înlocuiți cu o pereche nouă. Contactați profesionistul în domeniul oftalmologic pentru recomandări cu privire la purtarea lentilelor în timpul oricărei activități care implică apă.

[1] New England Journal of Medicine, September 21, 1989; 321 (12), pp. 773-783

4. MĂSURI DE PRECAUȚIE

- **NU** folosiți lentilele după data de expirare, dacă ambalajul steril individual (blister) este deschis sau dacă acesta este deteriorat.
- Atunci când procurați lentilele de contact pentru prima dată, înainte de a părăsi cabinetul PROFESIONISTULUI în domeniul OFTALMOLOGIC, asigurați-vă că puteți să le aplicați și să le îndepărtați (sau că este disponibilă o altă persoană care le poate îndepărta în locul dumneavoastră).
- Nu folosiți **NICIODATĂ** o pensetă sau alte instrumente pentru a scoate lentila din recipientul acesteia.
- Nu uitați să începeți întotdeauna cu același ochi.
- Înainte de a începe procedura de îndepărtare a lentilei, asigurați-vă întotdeauna că aceasta se află la nivelul ochiului și că vedeți clar.

Măsuri de precauție generale:
- Ca urmare a numărului mic de pacienți înrolați în investigațiile clinice cu privire la lentile, nu s-au evaluat în număr considerabil toate puterile refractive, toate configurațiile de design și toți parametrii lentilelor disponibili în materialul lentilei. În consecință, atunci când selectează un model adecvat de lentile și parametrii adecvați ai acestora, profesionistul în domeniul oftalmologic trebuie să țină cont de toate caracteristicile lentilelor care pot afecta performanța acestora și sănătatea oculară, inclusiv permeabilitatea la oxigen, umectabilitatea, grosimea centrală și periferică, precum și diametrul zonei optice.
- Impactul potențial al acestor factori asupra sănătății oculare a pacientului ar trebui să fie pus cu atenție în balanță în raport cu nevoia pacientului pentru corecția refractivă; prin urmare, sănătatea oculară continuă a pacientului și performanța continuă a lentilelor pe globii oculari trebuie să fie monitorizate cu atenție de profesionistul în domeniul oftalmologic care prescrie lentilele de contact.
- Dacă purtați lentilele de contact pentru corectarea presbiopiei utilizând corecția monovision sau multifocal, **puteți să nu** beneficiați de cea mai bună acuitate vizuală corectată pentru vederea la distanță sau cea de aproape. Persoane diferite au nevoi de vedere diferite, așa încât profesionistul în domeniul oftalmologic trebuie să se consulte cu dumneavoastră atunci când selectează tipul de lentilă care vă este cel mai potrivit.
- Profesionistul în domeniul oftalmologic trebuie să instruiască pacientul să îndepărteze imediat lentilele dacă ochii se înroșesc sau devin iritați.
- Contactați **întotdeauna** profesionistul în domeniul oftalmologic înainte de a aplica pe ochi orice medicament.
- **Trebuie să știți că** anumite medicamente, precum antihistaminicele, decongestionantele, diureticele, tranchilizantele, relaxantele musculare și antiemeticele pot cauza uscarea ochilor, senzația de corp străin (senzația de percepere a lentilei la nivelul ochiului) sau vedere încețoșată. Informați întotdeauna profesionistul în domeniul oftalmologic dacă întâmpinați orice problemă legată de lentilele dumneavoastră în timp ce luați astfel de medicamente.
- **Trebuie să știți că** dacă utilizați contraceptive orale (pilule contraceptive), s-ar putea să experimentați schimbări ale vederii sau ale confortului la purtarea lentilelor de contact.
- **Nu** schimbați tipul de lentilă (de ex., denumirea mărcii etc.) sau parametrii acesteia (de ex., diametrul, raza de curbură, puterea lentilelor etc.) fără a vă consulta cu profesionistul în domeniul oftalmologic.
- **Întotdeauna** să aveți disponibilă o pereche de ochelari funcțională pe baza unei prescripții actuale, pentru cazul în care nu puteți purta lentilele de contact sau pentru situațiile în care purtarea acestora nu este recomandată.
- La fel ca în cazul oricăror lentile de contact, sunt necesare controale periodice ulterioare pentru a asigura sănătatea continuă a ochilor. Întrebați profesionistul în domeniul oftalmologic care este programul recomandat de controale periodice ulterioare.

5. REACȚII ADVERSE (efecte secundare) – probleme posibile și modul de a proceda

Trebuie să știți că pot apărea probleme în timp ce purtați lentile de contact, care pot fi asociate cu următoarele simptome:
- senzații de arsură, de usturime, de mâncărime și/sau de uscăciune la nivelul ochilor;
- confort redus la purtarea lentilelor sau senzație de corp străin în ochi;
- umflare sau inflamație la nivelul ochilor sau în jurul acestora;
- roșeață oculară;
- probleme ale pleoapelor;
- umezirea ochilor și/sau secreții oculare neobișnuite;
- vedere neclară sau încețoșată;
- aură luminoasă sau colorată în jurul obiectelor;
- sensibilitate la lumină (fotofobie);
- Este posibil să apară unele deficiențe temporare din cauza infiltratelor periferice, ulcerului corneean periferic și eroziunii la nivelul corneei. Pot apărea și alte probleme fiziologice, cum ar fi edem local sau generalizat, neovascularizație la nivelul corneei colorarea corneei, aspect injectat anomalii ale conjunctivei tarsale, irită și conjunctivită, care, dacă sunt prezente cu grad redus, sunt acceptabile din punct de vedere clinic.

Atunci când apare oricare dintre simptomele de mai sus, poate fi prezentă o afecțiune oculară severă. TREBUIE SĂ ÎNDEPĂRTAȚI IMEDIAT LENTILELE și să fiți consultat(ă) de profesionistul dumneavoastră în domeniul oftalmologic cât mai repede, pentru ca problema să poată fi diagnosticată și tratată, dacă este necesar, și pentru a evita o afectare mai gravă a ochilor.

Recunoașterea problemelor și modul de a proceda
Este indicat să efectuați o autoexaminare simplă, cel puțin o dată pe zi, pe baza a trei întrebări. Pentru aceasta, trebuie să vă întrebați:
- Cum simt lentilele pe ochi?
- Cum arată ochii mei?
- Am observat o modificare a vederii?

Dacă observați orice problemă, TREBUIE SĂ VĂ SCOATEȚI IMEDIAT LENTILA. Dacă problema sau disconfortul dispare, eliminați lentila și aplicați o lentilă nouă pe ochi. Dacă după aplicarea lentilei noi, problema persistă, ÎNDEPĂRTAȚI IMEDIAT LENTILA ȘI CONTACTAȚI PROFESIONISTUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN DOMENIUL OFTALMOLOGIC.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Atunci când procurați lentilele de contact pentru prima dată, înainte de a părăsi cabinetul profesionistului în domeniul oftalmologic, asigurați-vă că puteți să le aplicați și să le îndepărtați (sau că este disponibilă o altă persoană care le poate îndepărta în locul dumneavoastră).
NU folosiți lentilele după data de expirare, dacă ambalajul steril individual (blister) este deschis sau dacă acesta este deteriorat.

Pasul 1: pregătirea

Este esențial să vă însușiți și să utilizați o bună igienă pentru întreținerea și manevrarea lentilelor de contact noi. Igiena este primul și cel mai important aspect al întreținerii corecte a lentilelor de contact. În special, înainte să manevrați lentilele asigurați-vă că aveți mâinile curate, uscate și fără urme de săpun, loțiuni sau creme.
Înainte de a începe:

Înaintea utilizării, asigurați-vă că data reviziei este cea mai recentă.

Johnson & Johnson VISION

- Înainte de a atinge lentilele, spălați-vă **întotdeauna** bine mâinile cu apă caldă și cu un săpun delicat, clătiți-le cu atenție și apoi uscați-le, folosind un prosop curat, care nu lasă scame, pentru a reduce probabilitatea apariției unei infecții.
- Înainte de a manevra lentilele, trebuie să evitați să utilizați orice săpun care conține cremă grasă, loțiune sau produse cosmetice. Aceste substanțe pot intra în contact cu lentilele și pot împiedica purtarea cu succes a acestora. Cel mai bine este să puneți lentilele înainte de a aplica machiajul.

Pasul 2: deschiderea ambalajului

Asigurați-vă întotdeauna că parametrii lentilelor [de ex., diametrul (DIA), raza de curbură (BC), puterea lentilelor (D) etc.] imprimați pe pachetul multiplu și pe ambalajul individual al lentilei (blister) corespund cu prescripția dvs. NU utilizați lentilele dacă există o nepotrivire.

Pachetul multiplu
Fiecare pachet multiplu conține lentile ambalate individual. Fiecare lentilă este introdusă în propriul ambalaj de plastic sigilat cu o folie, care este conceput special pentru a păstra lentila sterilă în timp ce este sigilată.

Ambalajul lentilei
Pentru a deschide un blister individual, respectați următoarele etape simple:
1. Agitați blisterul și asigurați-vă că lentila plutește în soluția din interior.
2. Dezlipiți cu grijă folia care sigilează ambalajul, pentru a expune lentila.
3. Poziționați un deget pe lentilă și glisați lentila în sus pe marginea recipientului, până când lentila iese din acesta. Uneori, o lentilă se poate lipi de suprafața interioară a foliei atunci când dezlipiți folia sau se poate bloca în ambalaj. Acest lucru nu va afecta sterilitatea lentilei. Aceasta poate fi utilizată în continuare în siguranță. Scoateți cu grijă lentila și inspectați-o urmând instrucțiunile de manevrare.

Sfaturi pentru manevrarea lentilelor
- Manevrați lentilele cu vârful degetelor și aveți grijă să nu intre în contact cu unghiile. Este util să aveți unghiile scurte și netede.
- După ce ați scos lentila din ambalaj, examinați-o pentru a vă asigura că este una singură și că este umedă și curată, fără crestături sau rupturi. Dacă lentila pare deteriorată, NU o utilizați.

Pasul 3: aplicarea lentilei pe ochi

Imediat după ce ați deschis ambalajul lentilei și ați examinat lentila, urmați pașii de mai jos pentru a o aplica pe ochi:
1. ASIGURAȚI-VĂ CĂ LENTILA NU ESTE ÎNTOARSĂ PE DOS, aplicând una dintre procedurile următoare:
   - Plasați lentila pe buricul degetului arătător și verificați aspectul acesteia. Lentila trebuie să aibă o formă curbată, firească, de castronaș. Dacă marginile lentilei au tendința de a fi orientate spre exterior, lentila este întoarsă pe dos.
   - Strângeți cu blândețe lentila între degetul mare și arătător. Marginile se vor orienta spre interior. Dacă lentila este întoarsă pe dos, marginile se vor orienta ușor spre exterior.
   - Puneți lentila pe vârful arătătorului și, ținând-o mai sus decât nivelul ochilor, identificați numerele 1-2-3. 1-2-3 indică orientarea corectă, în timp ce marcajul 1-2-3 inversat arată că lentila este întoarsă pe dos. În cazul în care lentila este întoarsă pe dos (marcajul 1-2-3 este inversat), întoarceți-o pe față și identificați din nou marcajul pentru a confirma orientarea corectă a lentilei. Trebuie să știți că marcajul 1-2-3 nu este prezent pe toate lentilele ACUVUE®.
2. Cu lentila pe degetul arătător, utilizați cealaltă mână pentru a ține pleoapa superioară astfel încât să nu clipiți.
3. Trageți în jos pleoapa inferioară cu celelalte degete ale mâinii pe care o folosiți pentru aplicarea lentilei.
4. Priviți în sus către tavan și plasați cu delicatețe lentila pe partea albă a porțiunii de jos a ochiului.
5. Dați drumul lent pleoapei și închideți ochiul pentru un moment.
6. Clipiți de mai multe ori pentru a centra lentila.
7. Utilizați aceeași tehnică atunci când aplicați lentila pe celălalt ochi.

Există și alte metode de aplicare a lentilelor de contact. Dacă metoda menționată mai sus vă este incomodă, rugați profesionistul dumneavoastră în domeniul oftalmologic să vă propună o metodă alternativă.

Pasul 4: centrarea lentilelor

O lentilă care se află pe cornee (cupola transparentă din partea din față a ochiului) se va deplasa foarte rar pe partea albă a ochiului în timpul purtării. Acest lucru se poate întâmpla, totuși, dacă procedurile de aplicare și de îndepărtare nu sunt efectuate corect. Pentru a centra lentila, puteți pune în aplicare oricare dintre următoarele proceduri:
- Închideți pleoapele și, printr-un masaj ușor, circular, centrați lentila, prin pleoapa închisă.

SAU

- Ținând ochii deschiși, deplasați ușor lentila descentrată pe cornee (centrul ochiului), presând cu un deget curat pe marginea pleoapei inferioare sau superioare.

Lentilele cosmetice și simptome vizuale
Lentilele de contact cu nuanță cosmetică pot lăsa să pătrundă mai puțină lumină decât lentilele non-cosmetice. Prin urmare, în timp ce le purtați puteți experimenta simptome vizuale (și anume, puteți vedea conturul lentilelor în zona vederii periferice).

Condiții periculoase
- Dacă, în timp ce purtați lentile, utilizați produse cu aerosoli (spray-uri), precum un spray pentru păr, țineți ochii închiși până când vaporii pulverizați se așază.
- **Evitați** orice contact cu vapori nocivi sau iritanți ori cu fum nociv sau iritant, în timpul purtării lentilelor.
- Nu clătiți **niciodată** lentilele în apă de la robinet. Apa de la robinet conține impurități care pot contamina sau deteriora lentilele și pot conduce la infecții sau leziuni ale ochilor.

Activitate ce implică apa
- Nu expuneți lentilele de contact la apă în timp ce le purtați.

Soluții de lubrifiere/reumectare
- Profesionistul în domeniul oftalmologic vă poate recomanda să utilizați o soluție de lubrifiere/reumectare. Acest tip de soluție poate fi utilizată pentru a umecta (lubrifia) lentilele în timp ce le purtați.
- **Nu** folosiți salivă sau alte substanțe pentru lubrifierea sau reumectarea lentilelor, ci doar soluțiile recomandate. Nu introduceți lentilele în gură.

Împrumutarea lentilelor
- Nu permiteți **niciodată** unei alte persoane să poarte lentilele dumneavoastră. Împrumutarea lentilelor de contact crește substanțial riscul infecțiilor oculare.

Respectarea regimului prescris, de purtare și înlocuire
- Nu purtați **niciodată** lentilele o perioadă de timp mai îndelungată decât cea recomandată de profesionistul în domeniul oftalmologic.
- **Îndepărtați întotdeauna** lentilele urmând recomandările profesionistului în domeniul oftalmologic.
- Orice produs neutilizat sau deșeu trebuie să fie eliminat în conformitate cu cerințele locale.

ÎNDEPĂRTAREA LENTILELOR

ATENȚIE: înainte de a încerca să îndepărtați lentila de contact, asigurați-vă de fiecare dată că aceasta este pe cornee (cupola transparentă din partea din față a ochiului). Stabiliți acest lucru acoperindu-vă celălalt ochi. Dacă vederea este încețoșată, înseamnă că lentila fie este pe partea albă a ochiului, fie nu se află deloc pe ochi. Pentru a localiza lentila, inspectați zona superioară a ochiului, privind în jos într-o oglindă și ridicând, totodată, cu degetul, pleoapa superioară. Apoi inspectați zona inferioară, trăgând în jos, pleoapa inferioară.

Spălați-vă bine mâinile, clătiți-le și uscați-le. Trebuie să urmați metoda care vă este recomandată de profesionistul în domeniul oftalmologic. Mai jos este exemplificată o metodă:

Metoda „ciupirii":
Pasul 1. Priviți în sus și glisați lentila spre partea de jos a ochiului utilizând degetul arătător.
Pasul 2. „Ciupiți" cu blândețe lentila între degetul mare și arătător.
Pasul 3. Scoateți lentila.

NOTĂ: pentru sănătatea ochilor dumneavoastră, este important ca lentilele să se poată mișca liber pe ochi. Dacă o lentilă se lipește (nu se mișcă) pe ochi, aplicați câteva picături din soluția de reumectare recomandată. Înainte de a scoate lentila, așteptați până când aceasta începe să se miște liber pe ochi. Dacă lentila continuă să nu se miște, trebuie să consultați imediat profesionistul în domeniul oftalmologic.

URGENȚE: dacă vă intră în ochi substanțe chimice de orice fel (produse de curățenie, soluții pentru grădinărit, substanțe chimice de laborator etc.): SPĂLAȚI IMEDIAT OCHII CU APĂ DE LA ROBINET ȘI CONTACTAȚI DE URGENȚĂ PROFESIONISTUL ÎN DOMENIUL OFTALMOLOGIC SAU MERGEȚI IMEDIAT LA UNITATEA DE PRIMIRI URGENȚE A UNUI SPITAL.

6. RAPORTAREA REACȚIILOR ADVERSE (efecte secundare)

Orice incident experimentat în timpul purtării lentilelor de contact ACUVUE® trebuie să fie raportat producătorului și/sau reprezentantului autorizat al acestuia și/sau autorității naționale.

Fabricat de:

USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,
7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA
IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, The National Technology Park, Limerick, Ireland

Pentru țara de origine, consultați ambalajul. Adresa completă indicată mai sus.

EC REP AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus,
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
www.acuvue.com

©Johnson & Johnson Vison Care Companies. Data revizuirii: 06.2021
Pe etichete sau pe ambalaj pot apărea următoarele simboluri.

Simbol	Definiție
	Atenție, consultați instrucțiunile de utilizare
	Producător
	Data fabricației
	A se utiliza până la (data de expirare)
LOT	Codul lotului
STERILE	Sterilizat cu aburi sau căldură uscată
	A nu se reutiliza (de unică folosință)
	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
	Taxă plătită pentru gestionarea deșeurilor
MD	Dispozitiv medical în Uniunea Europeană
	Indică un sistem de barieră sterilă unică
Rx only	ATENȚIE: legea federală a Statelor Unite restricționează achiziția acestui produs numai din unități specializate, pe baza unei prescripții de la un practician autorizat
UV Blocking	Filtru UV
EC REP	Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană
CE 2797	Marcaj CE și numărul de identificare al organismului notificat
DIA	Diametru
BC	Rază de curbură
D	Dioptrie (puterea optică a lentilei)
CYL	Cilindru
AXIS	Ax
MAX ADD	Cea mai mare adiție, de aproape, care poate fi corectată
LOW / L	Valoare „mică" a adiției de aproape (ADD)
MID / M	Valoare „medie" a adiției de aproape (ADD)
HGH / H	Valoare „mare" a adiției de aproape (ADD)
S_H	NATURAL SHIMMER™
S_P	NATURAL SPARKLE™
N	NATURAL SHINE™
123	Orientarea corectă a lentilelor
EST	Orientarea incorectă a lentilelor (suprafața interioară în exterior)
	„Marcaj de identificare" pentru recipiente și ambalaje de hârtie
	„Marcaj de identificare" pentru materiale compozite
A. B.	Deschiderea ambalajului (cutiei de carton)
	Conține substanțe periculoase
	Importator

Înaintea utilizării, asigurați-vă că data reviziei este cea mai recentă.